



1 性・年齢階級別(H27)

1 受診者割合(40~74歳)




年齢は平成28年3月31日現在

2 飲酒【質問票】




(飲酒【毎日】/受診者数(除無回答))×100

3 運動【質問票】




(30分以上の運動習慣【はい】/受診者数(除無回答))×100

4 喫煙割合【質問票】




(喫煙【はい】/受診者数(除無回答))×100

5 服薬(血圧)割合




(服薬(血圧)【はい】/受診者数(除無回答))×100

6 服薬(糖尿病)割合




(服薬(糖尿病)【はい】/受診者数(除無回答))×100

7 服薬(脂質)割合




(服薬(脂質)【はい】/受診者数(除無回答))×100

8 高血圧者割合(階層化判定基準)




収縮期130mmHg以上または拡張期85mmHg以上もしくは血圧を下げる薬を服用/受診者数

9 高血糖者割合(階層化判定基準)




空腹時血糖 ≥ 100 mg/dl又はHbA1c $\geq 5.6\%$ (NGSP値)又は服薬(血糖)/受診者数
 空腹時血糖とHbA1cを両方測定した場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

10 脂質異常者割合(階層化判定基準)




中性脂肪 ≥ 150 又はHDL-C < 40 又は服薬(脂質)/受診者数

11 腹囲陽性者割合(階層化判定基準)




腹囲≧(男85cm、女90cm)/受診者数(計測者のみ)

12 メタボリックシンドローム判定(基準該当・予備群該当者割合)




メタボリックシンドローム判定基準による「基準該当」「予備群該当」の割合(医師の判断)。ただし母数には「判定不能」を含まない

13 特定健診判定基準による判定



特定健診判定基準の「保健指導判定値」及び「受診勧奨判定値」により集計した

14 特定健診判定(保健指導レベル)割合



保健指導レベル判定(積極的支援)/受診者数
保健指導レベル判定(動機づけ支援)/受診者数